

OnLife®

OnLife® basiert auf Fatty Acids Group (F.A.G.®, patentiert), einem standardisierten Gemisch aus mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren, anderen spezifischen Fettsäuren, Palmitoylethanolamid und Lycopin, zur Wiederherstellung der korrekten Funktion der Zellmembranen des peripheren Nervensystems während der Chemotherapie. Die gestörte Funktion der Zellmembranen ist eine Ursache der peripheren Neuropathie.

Verwendung:

nach ärztlicher Empfehlung,
2 Tabletten täglich

Wichtige Hinweise:

Das Produkt muss unter ärztlicher Aufsicht verwendet werden.
Ergänzende bilanzierte Diät, nicht zur ausschließlichen Ernährung bestimmt.
Außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahren.
Nicht an Personen mit Schluckbeschwerden verabreichen.
Die Tablette kann in zwei Teile geteilt werden um die Einnahme zu erleichtern.

Nährwertdeklaration

	Pro 100 g	Pro 2 Tabletten
Energie	1575 kJ / 375 kcal	44 kJ / 10 kcal
Fett	37 g	1 g
davon:		
- gesättigte Fettsäuren	21 g	0,6 g
davon liegen vor als Palmitoylethanolamid	18,4 g	0,52 g
- einfach ungesättigte Fettsäuren	1,8 g	<0,1 g
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren	14,3 g	0,4 g
davon EPA und DHA	10 g	0,28 g
Kohlenhydrate	11 g	< 0,5 g
davon Zucker	0,8 g	< 0,5 g
Ballaststoffe	27 g	0,8 g
Eiweiß	13 g	< 0,5 g
Salz	1,6 g	0,037 g
davon Natrium	640 mg	14,8 mg
Lycopin	0,26 g	0,006 g

