

Zutaten: Lactobacillus reuteri DSM17648 (inaktiviert), Füllstoff: Reismehl, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle).

Verzehrempfehlung: 2x täglich 1 Kapsel mit Flüssigkeit unmittelbar vor oder während fester Mahlzeiten einnehmen.

Wichtige Hinweise: Diätmanagement bei Helicobacter pylori. Nicht für die Verwendung als einzige Nahrungsquelle geeignet. Unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Bei Raumtemperatur lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Pro Tagesverzehr	pro 100 g	2 Kapseln	% NRV*
Brennwert kJ/kcal	1174/280	8,83/2,11	* keine Daten vorhanden
Fett	0,16 g	0 g	
davon ges. Fettsäuren	0 g	0 g	
Kohlenhydrate	50,3 g	0,38 g	
davon Zucker	2,2 g	0,02 g	
Eiweiß	5,3 g	0,04 g	
Salz	0,35 g	0,002 g	
Pylopass™ Lactobacillus reuteri DSM17648 (inaktiviert)	61,3 g	2 x 10 ¹⁰ = 20 Mrd. (400 mg)	

*% NRV = Prozentanteil der empfohlenen Tagesdosis



Pylopass MONO

60 Kapseln

Pylopass™ MONO

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) zum Diätmanagement bei Helicobacter-pylori-Infektionen.

Nahrungsergänzungsmittel

Pylopass™ MONO enthält einen inaktivierten Lactobazillus reuteri-Stamm zum Diätmanagement von Magenschleimhaut-Entzündungen, die auf eine Helicobacter-pylori-Infektion zurückzuführen sind. Es kann speziell Helicobacter pylori im Magen binden und zur Ausscheidung bringen. Füllhöhe ist technisch bedingt. Für Diabetiker geeignet. Dargereichte Informationen sind keine Heilaussagen oder Aufforderungen zur Selbstmedikation.

SinoPlaSan GmbH

Silcherstr. 54
D-73666 Baltmannsweiler

sinoplasan.com

Charge/Mindestens
haltbar bis: siehe Boden

PZN-DE: 13426930
PZN-AT: 4737157

26 g



Pylopass™ is a registered trademark of Novozymes A/S, Denmark.



V2025-01