

PZN DE	Artikelbezeichnung	Nettofüllmenge	Kategorie	Lagerung	Verzehrempfehlung	Anwendungshinweise:	Wichtige Hinweise	Zutaten (inkl. Hilfsstoffe)	Allergene	Nährwertangaben (sofern nicht anders angegeben in g)	verantwortlicher Lebensmittelunternehmer																																				
OMNI-BIOTIC® 10																																															
13584793	OMNI-BIOTIC® 10	10x 5 g Sachets			Während der gesamten Antibiotika-Therapie 2 x täglich 1 Beutel OMNI-BIOTIC® 10 (= 5 g) in ca. 1/8 l Wasser oder auch (verdünnten) Fruchtsaft, Milch, Tee (bis max. 40° C), Joghurt o. Ä. einrühren, mindestens 1 Minute Aktivierungszeit abwarten, nochmals umrühren und dann verzehren.	Bitte beachten Sie generell: Die Flüssigkeit, in der Sie OMNI-BIOTIC® auflösen, • darf nicht heißer sein als 40° C (Bakterien vertragen genau dieselben Temperaturen wie der menschliche Körper), • sollte kein Kaffee, Alkohol oder anderes Produkt mit sehr saurem pH-Wert sein (z. B. Cola, Grapefruitsaft, Essig) und • möglichst keine Kohlensäure enthalten.	Dem Produkt wurde keinerlei tierisches Eiweiß, Gluten, Hefe oder Laktose zugefügt und es ist für Milchallergiker geeignet. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.	Maisstärke, Maltodextrin, Inulin , Kaliumchlorid, pflanzliches Eiweiß (Reis), Magnesiumsulfat, Bakterienstämme*, Fructooligosaccharide (FOS), Enzyme (Amylasen), Vanillearoma, Mangansulfat	n/a	<table><tr><td></td><td>1 Port. (= 5 g)</td><td>2 Port. (= 10 g)</td><td>100 g</td></tr><tr><td>Brennwert kJ</td><td>73</td><td>146</td><td>1.460</td></tr><tr><td>Brennwert kcal</td><td>17</td><td>35</td><td>349</td></tr><tr><td>Fett</td><td>0,02 g</td><td>0,04 g</td><td>0,40 g</td></tr><tr><td>davon gesättigte Fettsäuren</td><td>0,02 g</td><td>0,03 g</td><td>0,30 g</td></tr><tr><td>Kohlenhydrate</td><td>4,09 g</td><td>8,17 g</td><td>81,70 g</td></tr><tr><td>davon Zucker</td><td>0,39 g</td><td>0,78 g</td><td>7,80 g</td></tr><tr><td>Eiweiß</td><td>0,07 g</td><td>0,13 g</td><td>1,30 g</td></tr><tr><td>Salz</td><td>0,05 g</td><td>0,09 g</td><td>0,90 g</td></tr></table>		1 Port. (= 5 g)	2 Port. (= 10 g)	100 g	Brennwert kJ	73	146	1.460	Brennwert kcal	17	35	349	Fett	0,02 g	0,04 g	0,40 g	davon gesättigte Fettsäuren	0,02 g	0,03 g	0,30 g	Kohlenhydrate	4,09 g	8,17 g	81,70 g	davon Zucker	0,39 g	0,78 g	7,80 g	Eiweiß	0,07 g	0,13 g	1,30 g	Salz	0,05 g	0,09 g	0,90 g	Institut Allergosan Deutschland (privat) GmbH Nördliche Münchner Straße 47, D-82031 Grünwald (HRB 241674)
	1 Port. (= 5 g)	2 Port. (= 10 g)								100 g																																					
Brennwert kJ	73	146								1.460																																					
Brennwert kcal	17	35								349																																					
Fett	0,02 g	0,04 g	0,40 g																																												
davon gesättigte Fettsäuren	0,02 g	0,03 g	0,30 g																																												
Kohlenhydrate	4,09 g	8,17 g	81,70 g																																												
davon Zucker	0,39 g	0,78 g	7,80 g																																												
Eiweiß	0,07 g	0,13 g	1,30 g																																												
Salz	0,05 g	0,09 g	0,90 g																																												
13584824	OMNI-BIOTIC® 10	20x 5 g Sachets																																													
13947528	OMNI-BIOTIC® 10	30x 5 g Sachets																																													
13584830	OMNI-BIOTIC® 10	40x 5 g Sachets																																													
			Nahrungsergänzungsmittel	Trocken lagern	Nach der Antibiotika-Therapie möglichst noch 14 Tage lang 1 x täglich 1 Beutel einnehmen. Empfehlenswert ist die Einnahme auf möglichst leeren Magen, z. B. morgens vor dem Frühstück und/oder abends vor dem Abendessen oder vor dem Zubettgehen. Im Idealfall sollte zwischen der Einnahme von OMNI-BIOTIC® 10 und dem Antibiotikum ein Abstand von mindestens 1 Stunde eingehalten werden.	OMNI-BIOTIC®-Produkte enthalten in kleinen Mengen unterschiedliche Ballaststoffe, die den Bakterien als spezifische Nahrung dienen, z. B. auch Fructooligosaccharide (FOS) oder Inulin. Wenn eine Fructoseunverträglichkeit bekannt ist, sollten Sie die Aktivierungszeit von OMNI-BIOTIC® 10 auf 30 Minuten verlängern. In dieser Zeit verstoffwechseln die Bakterien ihre Nahrung (= Fructooligosaccharide, Inulin etc.) fast vollständig, sodass höchstens noch einzelne Moleküle dieser Stoffe in den Darm gelangen.																																									

Gerne übermitteln wir Ihnen unsere aktuellen Informationen zu den oben genannten Produkten. Wir ersuchen aber um Verständnis, dass wir nicht in der Lage sind, Sie aktiv zu informieren, sofern diese Informationen im Laufe der Zeit aktualisiert werden sollten.
Wir weisen daher darauf hin, dass Sie selbst verantwortlich bleiben für die Auswahl und Veröffentlichung dieser Informationen sowie dafür, diese Informationen aktuell zu halten.