| PZN: 17558806 | Datum: 19.08.2025 | [V25-02] |
|---|---|----------|
| Produktname: magnesium-Loges® vario 100 mg | Dr. Loges + Co. GmbH Schützenstraße 5 21423 Winsen (Luhe) | |

| Status: | | | |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|--|
| ☑ Nahrungsergänzungsmittel | ☐ Lebensmittel | ☐ diätetisches Lebensmittel | |
| □ | | | |
| Zutaten: | | | |
| | | | |

Magnesiummalat, Magnesiumbisglycinat, Kapselhülle: Hydroxypropylmethylcellulose; Magnesiumtaurat, Trennmittel: Magnesiumsalze der Speisefettsäuren

Zusammensetzung:

| Inhaltsstoffe | Pro 1 Kapsel / Pro 4 Kapseln | % NRV* |
|----------------------|---------------------------------|--------------|
| Magnesium | 100 mg / 400 mg | 26,7 / 106,7 |
| davon aus | | |
| Magnesiummalat | 60 mg / 240 mg | |
| Magnesiumbisglycinat | 29 mg / 116 mg | |
| Magnesiumtaurat | 11 mg / 44 mg | |

^{*}Nutrient Reference Values (Referenzmenge nach LMIV)

<u>Aufbewahrungsbedingung und ggf. Verwendungsbedingung nach dem Öffnen:</u>
Bitte bewahren Sie magnesium-Loges®vario 100 mg an einem trockenen Ort und nicht über 25 °C auf.

Nettofüllmenge/Stückzahl/Abtropfgewicht:

[60 Kapseln = 55,5 g] 120 Kapseln = 111 g [180 Kapseln = 111 g]

Gebrauchsanleitung, Zubereitungshinweis, sonstige Hinweise:

Verzehrempfehlung:

Täglich bis zu 4 Kapseln mit ausreichend Flüssigkeit schlucken, vorzugsweise dem individuellen Bedarf entsprechend über den Tag verteilt. Die Aufnahme von Eisen kann durch Magnesium gestört werden. Sollte gleichzeitig ein Eisenpräparat verwendet werden, ist ein zeitlicher Abstand von 2 bis 3 Stunden empfehlenswert.

Magnesiumpräparate können bei Tagesdosen über 250 mg bei empfindlichen Personen abführend wirken.

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Magnesium kann die Wirkung einiger Arzneimittel beeinflussen. Wenn Sie Arzneimittel einnehmen, sprechen Sie dazu bitte mit Ihrem Arzt oder Apotheker.