



Camphoral-Stroph



Homöopathisches Arzneimittel

Zusammensetzung:

10 g (10,9 ml) Mischung enthält:

arzneilich wirksame Bestandteile:

Calcium carbonicum Hahnemanni Dil.	D 10	1,0 g
Latrodectus mactans (HAB 34) Dil. (HAB, V. 4b, ø mit Ethanol 86% m/m)	D 10	1,0 g
Nerium oleander Dil.	D 6	1,0 g
Urginea maritima Dil.	D 4	0,9 g
Nitroglycerinum Dil.	D 4	1,0 g
Strophanthus gratus Dil.	D 4	1,5 g
Bryonia Dil.	D 3	1,0 g
Crataegus	ø	0,3 g
Kalmia latifolia Dil.	D 3	1,0 g
Convallaria majalis Dil.	D 1	0,1 g
Camphora Dil.	D 1	0,1 g
Selenicereus grandiflorus	ø	0,1 g
Arnica montana Dil.	D 3	1,0 g

1 g (1,09 ml) entspricht 34 Tropfen

Darreichungsform und Inhalt:

20, 50, 100 ml Mischung zum Einnehmen

Hersteller:

Pharm. Fabrik Kattwiga GmbH, Postfach 2567, 48514 Nordhorn

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweis: Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen:

Nicht anwenden bei Säuglingen und Kindern bis zum 6. Lebensjahr aufgrund des Inhaltsstoffes Camphora.

Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen Arnica oder gegen andere Korbblütler.

Nicht anwenden bei Alkoholkranken. Wegen des Alkoholgehaltes bei Leberkranken nur nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden.

Nicht anwenden bei gleichzeitiger Therapie mit Digitalisglykosiden und bei Kaliummangelzuständen.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Vorsicht bei Erregungsleitungsstörungen und bei i.v. Calcium-Therapie. Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Enthält 57 Vol.-% Alkohol

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Bei gleichzeitiger Einnahme von Chinidin, Calcium, Arzneimitteln zur Entwässerung, Abführmitteln und bei Langzeittherapie mit Cortison-haltigen Arzneimitteln werden Wirkung und Nebenwirkungen verstärkt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genußmittel ungünstig beeinflusst werden.

Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, 1 - 3 mal täglich 5 Tropfen vor den Mahlzeiten einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Hinweis:

Das Mittel muß auf Zucker oder pur gegeben werden, da in Wasser nicht löslich.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Nebenwirkungen:

Übelkeit, Erbrechen, Herzrhythmusstörungen.

Hinweis: Bei der Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.



Hinweis und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Verfalldatum ist auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum.

Nicht über 25°C lagern.

Stand der Information: Dezember 2007