

## Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

# FAGUSAN<sup>®</sup> L Ö S U N G

200 mg/15 ml Lösung zum Einnehmen  
Zur Anwendung bei Kindern ab 14 Jahren  
und Erwachsenen  
Wirkstoff: Guaifenesin

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss FAGUSAN jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach 5 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

### **Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist FAGUSAN und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von FAGUSAN beachten?
3. Wie ist FAGUSAN einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist FAGUSAN aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

## **1. WAS IST FAGUSAN UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?**

FAGUSAN ist ein sekretlösendes Mittel zur Förderung des Auswurfs von Bronchialsekret (sekretolytisches Expektoranz) und wird angewendet zur Schleimlösung im Bronchialbereich und zur Erleichterung des Abhustens bei:

- Erkältungen und grippalen Infekten
- Entzündung der Bronchien (Bronchitis)

## **2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON FAGUSAN BEACHTEN?**

### **FAGUSAN DARF NICHT eingenommen werden**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Guaifenesin, den Farbstoffen Gelborange S (E 110) bzw. Ponceau 4R (E 124) oder einem der sonstigen Bestandteile von FAGUSAN sind (sonstige Bestandteile siehe Abschnitt 6)

- wenn Sie an einer Magen-Darm-Erkrankung leiden

Hinweis: FAGUSAN ist für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet.

### **Besondere Vorsicht bei der Einnahme von FAGUSAN ist erforderlich**

- bei eingeschränkter Funktion der Nieren
- wenn Sie an einer bestimmten Form der Muskelschwäche leiden (Myasthenia gravis)

Fragen Sie in diesen Fällen Ihren Arzt, bevor Sie FAGUSAN einnehmen.

### **Bei Einnahme von FAGUSAN mit anderen Arzneimitteln**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

FAGUSAN kann die Wirkung verstärken von:

- Beruhigungsmitteln (Sedativa)

- muskelentspannenden Arzneimitteln (Muskelrelaxanzien), die z. B. bei der Betäubung (Narkose) während einer Operation angewendet werden.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Fragen Sie vor Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

FAGUSAN darf in der Schwangerschaft nicht eingenommen werden, da es beim Menschen Hinweise auf Fehlbildungen gibt (Nabelbrüche) und für das zweite und dritte Schwangerschaftsdrittel keine genügenden Erfahrungen vorliegen.

FAGUSAN darf in der Stillzeit nicht eingenommen werden, da nicht bekannt ist, ob der Wirkstoff von FAGUSAN in die Muttermilch übergeht.

### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

FAGUSAN kann die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigen.

### **Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von FAGUSAN**

- FAGUSAN enthält 11 Vol.-% Alkohol. Bei Beachtung der Dosierungsanleitung werden bei jeder Einnahme (15 ml) bis zu 1,7 g Alkohol zugeführt. Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Patienten mit organischen Erkrankungen des Gehirns, Schwangeren, Stillenden und Kindern. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.
- Warnhinweis: Dieses Arzneimittel enthält die Farbstoffe Gelborange S (E 110) und Ponceau 4R (E 124), die bei Personen, die gegen diese Stoffe besonders empfindlich sind, allergieartige Reaktionen hervorrufen können.
- Dieses Arzneimittel enthält Sorbitol. Bitte nehmen Sie FAGUSAN erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

## **3. WIE IST FAGUSAN EINZUNEHMEN?**

Nehmen Sie FAGUSAN immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

### **Dosierung**

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren nehmen alle 4 Stunden bis zum Schlafengehen 15 ml FAGUSAN (entsprechend 200 mg Guaifenesin) ein. Bitte verwenden Sie dazu den beigegefügteten Dosierbecher und beachten Sie die Skalierung!

Hinweis: FAGUSAN darf nicht mehr als 6 x täglich eingenommen werden!

### **Art der Anwendung**

Sie können FAGUSAN mit reichlich Flüssigkeit verdünnt einnehmen. Füllen Sie dazu den Dosierbecher bis zur Marke von 15 ml mit FAGUSAN und gießen Sie den Inhalt in ein Glas Mineralwasser. Falls Sie die 15 ml FAGUSAN unverdünnt einnehmen, trinken Sie anschließend ein Glas Wasser.

### **Dauer der Anwendung**

Sie sollten FAGUSAN ohne ärztlichen Rat nicht länger als 3–5 Tage einnehmen. Sofern dann noch keine wesentliche Besserung des Abhustens von Schleim eingetreten ist oder bei anhaltendem Husten sollten Sie einen Arzt aufsuchen, da eine ernsthaftere Erkrankung vorliegen könnte.

Hinweis: FAGUSAN darf nicht länger als zwei Wochen hintereinander eingenommen werden!

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von FAGUSAN zu stark oder zu schwach ist.

### **Wenn Sie eine größere Menge FAGUSAN eingenommen haben, als Sie sollten**

Bei Einnahme zu hoher Arzneimengen kommt es in der Regel zu keinen Vergiftungserscheinungen. Bei stark überhöhten Einnahmemengen ist mit Übelkeit und Erbrechen, sowie einer Muskeler schlaffung zu rechnen. In diesem Fall sollte der nächst erreichbare Arzt zu Hilfe gezogen werden.

Wenn Sie FAGUSAN über längere Zeit in größerer Menge einnehmen als Sie sollten, kann es zur Bildung von Nierensteinen kommen.

### **Wenn Sie die Einnahme von FAGUSAN vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Fahren Sie mit der Einnahme unverändert fort.

### **Wenn Sie die Einnahme von FAGUSAN abbrechen**

Falls Sie die Behandlung infolge von Nebenwirkungen abbrechen, fragen Sie bitte Ihren Arzt, welche Gegenmaßnahmen es gibt. Falls Sie das Arzneimittel absetzen, weil es bei Ihnen nicht wie erwünscht wirkt, fragen Sie bitte Ihren Arzt, ob andere Arzneimittel in Frage kommen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

## **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann FAGUSAN Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen wird folgende Kategorie zugrunde gelegt:

Sehr selten: weniger als 1 Behandler von 10.000

Sehr selten:

#### Erkrankungen des Immunsystems:

Überempfindlichkeitsreaktionen (z. B. Hautausschlag, Juckreiz, Atemnot durch Verengung der Atemwege), einschließlich schwerer Überempfindlichkeitsreaktionen

(Anaphylaxie, häufig verbunden mit Blutdruckabfall, Schwindel, Übelkeit und Atemnot).

#### Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts:

Sodbrennen, Übelkeit, Erbrechen.

#### Erkrankungen des Nervensystems:

Schwindel, Kopfschmerzen.

Hinweis: Die sonstigen Bestandteile Gelborange S (E 110) und Ponceau 4R (E 124) können Überempfindlichkeitsreaktionen hervorrufen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

## **5. WIE IST FAGUSAN AUFZUBEWAHREN?**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Nicht kühlen oder einfrieren!

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem Verfalldatum nicht mehr verwenden. Dieses finden Sie auf der Faltschachtel nach "Verwendbar bis". Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Die Dauer der Haltbarkeit nach Anbruch der Flasche beträgt 2 Wochen.

Bitte verwenden Sie FAGUSAN nicht mehr, wenn Sie Folgendes bemerken: Der Inhalt zeigt eine deutliche Trübung oder Kristallbildung auch vor Ablauf des Verfalldatums.

## **6. WEITERE INFORMATIONEN**

### **Was FAGUSAN enthält**

Der Wirkstoff ist Guaifenesin.

15 ml Lösung enthalten 200 mg Guaifenesin.

Die sonstigen Bestandteile sind: Enziantinktur, Ethanol 96 %, Glycerol 85 %, Kaliumsorbat, Milchsäure, Natriumcyclamat, Pomeranzentinktur, Rotorange (Mischung aus Chinolingelb (E 104), Gelborange S (E 110), Ponceau 4R (E 124), Indigocarmin (E 132), Trägerstoff Na-

triumchlorid), Saccharin-Natrium, Sorbitol-Lösung 70 % (nicht kristallisierend), Gereinigtes Wasser.

### **Wie FAGUSAN aussieht und Inhalt der Packung**

FAGUSAN ist eine klare, rot-orange Flüssigkeit.  
Originalpackung mit einer Flasche zu 200 ml.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH  
Von-Humboldt-Str. 1  
64646 Heppenheim  
[www.infectopharm.com](http://www.infectopharm.com)

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt geändert im August 2010.**

470001/03-G