

# Gebrauchsinformation

WOELM PHARMA GMBH & CO., 53587 Bad Honnef  
EIN UNTERNEHMEN DER JOHNSON & JOHNSON/MSD

## **Tirgon®**

### **Wirkstoff: Bisacodyl**

#### Zusammensetzung

1 magensaftresistente Tablette enthält:  
arzneilich wirksamer Bestandteil:  
Bisacodyl 5 mg.

sonstige Bestandteile:

Lactosemonohydrat, Mikrokristalline Cellulose, Eudragit L 30 D-55, Talkum, Stearinsäure, Magnesiumstearat, Triethylcitrat, Titandioxid (E171), Siliciumdioxid, Saccharin-Natrium, Natriumhydroxid.

#### Anwendungsgebiete

Zur kurzfristigen Anwendung bei Verstopfung sowie bei Erkrankungen, die einen erleichterten Stuhlgang erfordern.

#### Gegenanzeigen

Bisacodyl darf nicht angewendet werden bei Darmverschluss. Es sollte nicht angewendet werden bei akut-entzündlichen Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes.

#### Nebenwirkungen

Nebenwirkungen sind bei kurzfristiger Einnahme selten.

Bei längerdauernder oder hochdosierter Anwendung kommt es häufig zum Verlust von Kalium und anderen Elektrolyten. Dies kann zu Störungen der Herzfunktion und zu Muskelschwäche führen, insbesondere bei gleichzeitiger Einnahme von harntreibenden Mitteln und Nebennierenrindenhormonen. Die Empfindlichkeit gegenüber Herzglykosiden wird verstärkt.

#### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Bisacodyl kann den Kaliumverlust durch andere Arzneimittel (z.B. harntreibende Mittel) verstärken.

## **Dosierungsanleitung und Art der Anwendung**

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene und Kinder über 6 Jahre abends je nach Bedarf 1-2 magensaftresistente Tabletten ein. Die Dosis sollte 0,3 mg Bisacodyl pro Kilogramm Körpermasse nicht überschreiten.

Der Wirkungseintritt erfolgt nach 6-10 Stunden.

## **Dauer der Anwendung**

Eine längere Anwendung von Bisacodyl sollte nicht ohne ärztliche Anweisung erfolgen. Jede über eine kurzdauernde Anwendung hinausgehende Einnahme von Bisacodyl führt zu einer Verstärkung der Darmträgheit.

Das Arzneimittel soll nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

**Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!**

---

## **Darreichungsform und Packungsgröße**

Packungen mit 30 magensaftresistenten Tabletten

Packungen mit 60 magensaftresistenten Tabletten

Bündelpackung mit 240 (4 x 60) magensaftresistenten Tabletten

Stand der Information: Oktober 1993