

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Prostaforton® uno

Filmtabletten

Wirkstoff: 285 mg Brennnesselwurzel-Trockenextrakt

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Prostaforton® uno jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Prostaforton® uno und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Prostaforton® uno beachten?
3. Wie ist Prostaforton® uno einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Prostaforton® uno aufzubewahren?
6. Weitere Informationen



1 Was ist Prostaforton® uno und wofür wird es angewendet?

Prostaforton® uno ist ein pflanzliches Arzneimittel bei Prostata-Erkrankungen.

Prostaforton® uno wird angewendet bei Beschwerden beim Wasserlassen bei gutartiger Vergrößerung der Prostata (Miktionsbeschwerden bei benigner Prostatahyperplasie Stadium I bis II nach Alken bzw. II bis III nach Vahlensieck).

Dieses Medikament bessert nur die Beschwerden bei einer vergrößerten Prostata, ohne die Vergrößerung zu beheben. Bitte suchen Sie daher in regelmäßigen Abständen Ihren Arzt auf. Insbesondere bei Blut im Urin oder bei akuter Harnverhaltung sollte ein Arzt aufgesucht werden.

2 Was müssen Sie vor der Einnahme von Prostaforton® uno beachten?

Prostaforton® uno darf nicht eingenommen werden, bei einer bekannten Überempfindlichkeit gegen Zubereitungen aus Brennnesselwurzel oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels.

Suchen Sie in regelmäßigen Abständen Ihren Arzt auf, da Prostaforton® uno die Vergrößerung der Prostata nicht behebt.

Bei Einnahme von Prostaforton® uno mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bisher sind keine Wechselwirkungen zwischen Prostaforton® uno und anderen Arzneimitteln bekannt geworden.

Bei Einnahme von Prostaforton® uno zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken sind keine Besonderheiten zu beachten.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Prostaforton® uno

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Prostaforton® uno daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie an einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Hinweis für Diabetiker:

1 Filmtablette enthält weniger als 0,01 BE.

3 Wie ist Prostaforton® uno einzunehmen?

Nehmen Sie Prostaforton® uno immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

1 mal täglich 1 Filmtablette.

Art der Anwendung

Zum Einnehmen

Filmtabletten nicht im Liegen einnehmen. Nehmen Sie die Filmtabletten jeweils zur gleichen Tageszeit unzerkaut mit etwas Flüssigkeit (vorzugsweise ein Glas Trinkwasser) nach einer Mahlzeit ein.

Fortsetzung auf der Rückseite >>

Dauer der Anwendung

Die Dauer der Anwendung ist prinzipiell nicht beschränkt, beachten Sie jedoch die Angaben unter "Anwendungsgebiete".

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Prostafor[®] uno zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Prostafor[®] uno eingenommen haben, als Sie sollten

Bei Überdosierung von Prostafor[®] uno kann es zum verstärkten Auftreten der Nebenwirkungen kommen (siehe unter "Nebenwirkungen"). In diesem Fall sollten Sie Rücksprache mit einem Arzt nehmen.

Wenn Sie die Einnahme von Prostafor[®] uno vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, sondern fahren Sie mit der Einnahme, wie von Ihrem Arzt verordnet oder in der Gebrauchsinformation beschrieben, fort.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4 Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Prostafor[®] uno Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

sehr häufig:	mehr als 1 von 10 Behandelten
häufig:	weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
gelegentlich:	weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1.000 Behandelten
selten:	weniger als 1 von 1.000, aber mehr als 1 von 10.000 Behandelten
sehr selten:	1 Fall oder weniger von 10.000 Behandelten, einschließlich Einzelfälle

Bedeutsame Nebenwirkungen oder Zeichen, auf die Sie achten sollten, und Maßnahmen, wenn Sie betroffen sind:

Wenn Sie von einer der nachfolgend genannten Nebenwirkungen betroffen sind, nehmen Sie Prostafor[®] uno nicht weiter ein und suchen Sie Ihren Arzt möglichst umgehend auf.

Gelegentlich treten leichte Magen-Darm-Beschwerden auf.

Selten werden Überempfindlichkeitsreaktionen (z.B. Juckreiz, Hautausschlag und Nesselsucht) beobachtet. Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5 Wie ist Prostafor[®] uno aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton bzw. Behältnis angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

Nicht über 25 °C aufbewahren.

6 Weitere Informationen

Was Prostafor[®] uno enthält:

Der Wirkstoff ist:

Brennnesselwurzel - Trockenextrakt

1 Filmtablette enthält 285 mg Trockenextrakt aus Brennnesselwurzel (15-20 : 1); Auszugsmittel: Ethanol 80 % (V/V)

Die sonstigen Bestandteile sind:

Macrogol 4000, Glycerol-Macrogol-400-Docosanoat, hochdisperses Siliciumdioxid, Lactose-Monohydrat, mikrokristalline Cellulose, Magnesiumstearat (Ph.Eur.), Croscarmellose-Natrium, Hypromellose, Titandioxid (E 171), Eisenoxidhydrat (E 172)

Wie Prostafor[®] uno aussieht und Inhalt der Packung

Die Filmtabletten sind ockerfarben.

Prostafor[®] uno ist in Packungen mit 60 und 120 Filmtabletten erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer HEXAL AG

Industriestraße 25

83607 Holzkirchen

Telefon: (08024) 908-0

Telefax: (08024) 908-1290

e-mail: pafientenservice@hexal.de



Hersteller

Salutas Pharma GmbH

ein Unternehmen der HEXAL AG

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Juni 2006 601786