

Bolfo® Fogger

Umgebungsspray mit Langzeitwirkung (ca. 6 Monate) gegen Flöhe, Flohlarven und Floheier



- Zusammensetzung :** 100 g Lösung enthalten 0,04 g Cyfluthrin, 0,05 g Pyriproxyfen. Treibmittel.
- Darreichungsform :** Sprühautomat mit 150 ml
- Anwendungsgebiete :** Zur Langzeitbekämpfung von Flöhen in der Umgebung der Tiere (Decken, Körbchen etc.).
- Gegenanzeigen :** **Nicht am Tier anwenden.**
- Dosierungsanleitung mit Art und Dauer der Anwendung :** Bei Anwendung des Bolfo® Sprühautomaten sollte wie folgt verfahren werden:

1. Fenster und Außentüren schließen.
2. Nahrungsmittel und Küchengeräte abdecken oder entfernen.
3. Alle Haustiere aus dem Raum bringen, Aquarien sowie empfindliche oder wertvolle Gegenstände abdecken oder entfernen.
4. Sprühautomat auf eine unempfindliche Unterlage stellen.
5. Den Bolfo® Sprühautomaten in der Mitte des Raumes aufstellen. Die Taste des Sprühautomaten ganz niederdrücken, bis sie einrastet.
6. Raum verlassen, Türen schließen. Die Sprühdose entleert sich binnen 4 Minuten.
7. 2 Stunden einwirken lassen. Danach den Raum gründlich lüften.

Dose steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Erwärmung über 50°C schützen. Nicht in offene Flamme oder auf heiße Flächen sprühen. Dose nicht gewaltsam öffnen. Nur restlos entleerte Dosen wegwerfen.

Nach Gebrauch Hände sorgfältig waschen.

Eine Dose reicht für 50 m².

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Warnhinweise :

Sprühnebel nicht einatmen! Asthmatiker sind besonders gefährdet. Sensible Personen (z.B. Allergiker oder mit vielfacher Chemikalienüberempfindlichkeit) sollten das Präparat nicht anwenden. Hautreizend.

Wissenswertes :

Flöhe stellen in der Haustierhaltung ein zunehmend größeres Problem dar. Die Entwicklung der Eier, Larven- und Puppenstadien findet nicht am Tier, sondern in der Umgebung statt. Deshalb muss bei Flohbefall auch die Umgebung behandelt werden. Die Wirkstoffe von Bolfo® Umgebungsspray wirken zweifach:

- Ausgewachsene Flöhe sowie Larven werden sofort getötet.
- Ein biologischer Wachstumsregulator verhindert die Entwicklung der Eier und Larven bis zu 6 Monaten.

Die beiden Wirkstoffe Cyfluthrin und Pyriproxyfen haben eine synergistische Wirkung und sichern somit eine sofortige und lang anhaltende Wirkung. Cyfluthrin gehört zu den Pyrethroiden. Es führt zu verstärktem

Bolfo[®] Fogger

Einstrom von Natriumionen. Eine Reizübermittlung wird unmöglich. Insekten und Spinnentiere sterben. Wirksamkeit 100 % über 1 Woche. PPF gehört zu den IGR's (Insect Growth Regulators). Es reichert sich in jedem Fett enthaltendem Gewebe an - sogar in Insekteneiern. Es unterbricht die Embryogenese, die Verpuppung oder verhindert das Schlüpfen der Insekten aus den Puppen. Wirksamkeit 100 % über 6 Monate.

