



#### 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Anwendung von Imogas forte bzw. Simecton wurden bisher nicht beobachtet. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken sollten.

#### 5. Wie ist Imogas forte aufzubewahren?

Für Kinder unerreichbar und nicht sichtbar aufbewahren.

Das Verfallsdatum ist auf Faltschachtel und Blister aufgedruckt.

Sie dürfen Imogas forte nach dem angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

Stand der Information: November 2009

#### 6. Weitere Angaben

Bei neu auftretenden und länger anhaltenden Bauchbeschwerden sollten Sie einen Arzt aufsuchen, damit die Ursachen der Beschwerden und eine u.U. zugrunde liegende behandlungsbedürftige Erkrankung erkannt werden kann.

#### Ergänzende Informationen

Fast jeder Dritte leidet in Deutschland gelegentlich unter Beschwerden wie Blähungen und Völlegefühl. Ursache für diese Beschwerden ist häufig eine erhöhte Menge an Gas im Darm, das den Körper nur verzögert verlassen kann.

#### Wie kommt es zu diesen erhöhten Mengen an Gas?

Normalerweise geht ein Großteil der Gase über die Darmwand ins Blut über und wird anschließend über die Lunge mit der Atemluft freigesetzt.

Veranlagung, bestimmte Lebensmittel oder verstärktes Schlucken von Luft während des Essens können zu einer vermehrten Gas- und Schaumbildung im Darm (Blähungen) führen. Schaum kann grundsätzlich nicht durch die Darmwand aufgenommen werden. Das hat zur Folge, dass der Abtransport der Gase verhindert wird. Der dabei entstehende Druck auf die Darmwand kann Beschwerden wie Völlegefühl hervorrufen.

#### Wie wirkt Imogas forte?

Imogas forte Weichkapseln mit dem Bestandteil Simecton bewirken, dass die schaumähnlichen Blasen zerfallen und das Gas frei wird. Damit können die Gase den Körper wieder auf natürliche Weise, hauptsächlich über die Atemluft, verlassen.

Imogas forte Weichkapseln sind sehr gut verträglich, weil sie ihre Wirkung nur im Darm entfalten und den Körper so nicht belasten. Imogas forte kann bei Bedarf über einen längeren Zeitraum eingenommen werden.



#### Gebrauchsanweisung

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Produkt ist ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Imogas® forte jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihr Krankheitsbild verschlimmert oder nach einigen Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.

1. Was ist Imogas forte und wogegen wird es eingenommen?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Imogas forte beachten?
3. Wie ist Imogas forte einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Imogas forte aufzubewahren?
6. Weitere Angaben

**Imogas**<sup>®</sup>  
forte

1 Weichkapsel enthält als wirksamen Bestandteil 240 mg Simecton.  
Die sonstigen Bestandteile sind Gelatine und Glycerol.  
Imogas forte ist in Packungen mit 20, 40 und 60 Weichkapseln erhältlich.



## 1. Was ist Imogas forte und wogegen wird es eingenommen?

Dieses Mittel ist ein sogenannter Entschäumer.

<p><b>CE 0481</b></p> <p><b>Hersteller:</b> Johnson &amp; Johnson MEDICAL GmbH Robert-Koch-Straße 1 22851 Norderstedt Deutschland</p>	<p><b>Vertrieb in Deutschland / Österreich:</b> McNeil GmbH &amp; Co. oHG Postfach 21 04 11 41430 Neuss Deutschland Tel.: 00800 260 260 00 (kostenfrei)</p>
---	---

Es wird angewendet:

zur symptomatischen Behandlung bei

- gasbedingten Magen-Darm-Beschwerden, z. B. Blähungen (Meteorismus), Völlegefühl.
- funktioneller Dyspepsie.

## 2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Imogas forte beachten?

**Imogas forte darf nicht eingenommen werden,**

wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Simeticon oder einem der sonstigen Bestandteile von Imogas forte sind.

**Worauf müssen Sie noch achten?**

Kinder und Jugendliche

Zur symptomatischen Behandlung gasbedingter Magen-Darm-Beschwerden sollten Sie Imogas forte nicht an Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren geben. Für diese Altersgruppe stehen andere Darreichungsformen zum Erreichen einer geeigneten Dosis zur Verfügung.

Schwangerschaft

Es bestehen keine Bedenken gegen die Einnahme von Imogas forte während der Schwangerschaft.

Stillzeit

Es bestehen keine Bedenken gegen die Einnahme von Imogas forte während der Stillzeit.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln**

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sind nicht bekannt.

## 3. Wie ist Imogas forte einzunehmen?

Nehmen Sie Imogas forte immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Alter	Einzeldosis	Tagesgesamtdosis
Jugendliche ab 14 Jahren und Erwachsene	1 Kapsel (entsprechend 240 mg Simeticon)	2 - 4 Kapseln (entsprechend 480 - 960 mg Simeticon)

Imogas forte wird zu oder nach den Mahlzeiten, bei Bedarf auch vor dem Schlafengehen, eingenommen. Die Kapseln sollen nicht im Liegen eingenommen werden. Die Kapsel bzw. die Kapseln werden unzerkaut mit genügend Flüssigkeit (z. B. 1 Glas Wasser) geschluckt.

Die Dauer der Anwendung richtet sich nach dem Verlauf der Beschwerden.

Imogas forte kann, falls wirksam und auf Grund der Beschwerden weiterhin notwendig, sowohl über längere Zeit als auch wiederholt eingenommen werden. Ohne ärztliche Anweisung sollten Sie Imogas forte allerdings nicht länger als 4 Wochen ununterbrochen anwenden.

