

Reparil Gel N - Produktinformation

Basierend auf seiner Philosophie der Einheit von Natur und Wissenschaft hat **MADAUS** nun gemeinsam mit **FPZ** einen [Ratgeber für Rückenschmerz-patienten \(PDF, 247 KB\)](#) herausgegeben, in dem das neue Nährstoffprogramm "MADAUS be well - Bausteine für ´s Leben" vorgestellt und maßgeschneiderte Präparate für Menschen mit Rückenschmerzen empfohlen werden.

Diese Produktinformation entspricht in allen wesentlichen Teilen der in Deutschland gesetzlich vorgeschriebenen Gebrauchsinformation.

Abschwellendes, entzündungshemmendes und schmerzlinderndes Aescin-Gel

Zusammensetzung

100g Gel enthalten:

Aescin 1 g

Diethylamin-salicylat 5 g

Hilfsstoffe: Polyacrylsäure, Macrogol-6-Capryl-/Caprinsäure-Glyceride, Edetinsäure-Natrium, Trometamol, 2-Propanol, Geruchsstoffe

Gel zur äußerlichen Anwendung

Originalpackung mit 100 g [N2] Gel. Abschwellendes, entzündungshemmendes und schmerzlinderndes Gel.

Madaus GmbH, 51101 Köln

Tel.: 02 21/89 98-0, Fax: 02 21/89 98-711, e-mail: info@madaus.de

Anwendungsgebiete

Verletzungen mit Prellungen, Verstauchungen, Quetschungen, Blutergüssen, Sehnenscheidenentzündungen.

Schmerzsyndrome der Wirbelsäule (Bandscheibe, Nackenschmerzen, Hexenschuß, Ischias).

Oberflächliche Venenentzündungen, Krampfadern. Zur Venenpflege nach Injektionen bzw. Infusionen.

Gegenanzeigen

Reparil-Gel N soll nicht auf offene Hautstellen, Schleimhäute und strahlenbehandelte Hautpartien aufgetragen werden.

Hinweis: Eine Langzeitbehandlung auf großen Flächen sollte während der Schwangerschaft und Stillzeit vermieden werden, ebenso die Anwendung im Brustbereich während der Stillzeit.

Nebenwirkungen

In seltenen Fällen können allergische Hauterscheinungen auftreten. Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese

bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt.

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung

Soweit nicht anders verordnet, ein- bis mehrmals täglich auf die Haut über dem erkrankten Bereich auftragen und verteilen. Einmassieren ist nicht erforderlich, wenn erwünscht, jedoch möglich.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel und auf der Tube aufgedruckt.

Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Dieses Arzneimittel ist nach den gesetzlichen Übergangsvorschriften im Verkehr. Die behördliche Prüfung auf pharmazeutische Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit ist noch nicht abgeschlossen.

Stand der Information: Februar 2001

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Weiterführende Informationen:**Eigenschaften**

Reparil-Gel N ist eine Spezialzubereitung in alkoholischer Grundlage mit Dreifachwirkung: abschwellend, entzündungshemmend und schmerzlindernd.

Aescin in hautdurchgängiger Form verhindert Wasseransammlungen im Gewebe und führt zur Abschwellung des Gewebes. Lokale Schwellungen, die Schweregefühl und Spannungsschmerz verursachen, werden rasch beseitigt. Entzündliche Prozesse werden wirksam bekämpft.

Die Salicylsäureverbindung verstärkt den entzündungshemmenden Effekt und hat eine besonders tiefenwirksame, schmerzlindernde Wirkung.

Reparil-Gel N hat außerdem noch folgende Vorzüge:

- Reparil-Gel N ist transparent und dringt rasch und vollständig in das erkrankte Gewebe ein.
- Reparil-Gel N fettet nicht, schmiert nicht und ist deshalb besonders angenehm und sauber anwendbar.
- Reparil-Gel N kühlt den schmerzenden Bereich, ist hautschonend und auch für empfindliche Hautpartien hervorragend verträglich.