

# DUOVENTRINETTEN<sup>®</sup> N

Kautabletten zum Einnehmen

Wirkstoffe: Magnesiumhydroxid, Magnesiumtrisilicat, Aluminiumhydroxid-Magnesiumcarbonat-Gel

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Duoventrinetten N jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach einigen Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

## Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Duoventrinetten N und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Duoventrinetten N beachten?
3. Wie ist Duoventrinetten N einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Duoventrinetten N aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

### 1. WAS IST DUOVENTRINETTEN N UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Duoventrinetten N ist ein Mittel zur Bindung überschüssiger Magensäure.

#### Anwendungsgebiete:

Zur symptomatischen Behandlung von Erkrankungen, bei denen die Magensäure gebunden werden soll: Sodbrennen und säurebedingte Magenbeschwerden.

### 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON DUOVENTRINETTEN N BEACHTEN?

Duoventrinetten N darf nicht eingenommen werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile sind
- bei vermindertem Phosphatblutspiegel (Hypophosphatämie).

#### Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Duoventrinetten N ist erforderlich:

Duoventrinetten N darf bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion (Kreatininclearance < 30 ml/min.) nur bei regelmäßiger Kontrolle der Magnesium- und Aluminium-Blutspiegel gegeben werden.

**Kinder:**

Geben Sie dieses Arzneimittel nicht an Kinder unter 12 Jahren, da in dieser Altersgruppe keine ausreichenden Erfahrungen vorliegen.

**Bei Anwendung von Duoventrinetten N mit anderen Arzneimitteln:**

Beachten Sie, dass diese Angaben auch für vor kurzem angewandte Arzneimittel gelten können. Die gleichzeitige Verabreichung von säurebindenden Magenmitteln (Antazida) mit anderen Arzneimitteln (z.B. Tetracycline, Ciprofloxacin, Ofloxacin, Pefloxacin, Herzglykoside, Atropin, Eisen, Cimetidin) sollte vermieden werden, da hierdurch die Aufnahme der mitverabreichten Arzneimittel beeinflusst werden kann. Deswegen sollte die Einnahme anderer Arzneimittel 1-2 Stunden vor oder nach der Einnahme der Duoventrinetten N Kautabletten erfolgen.

**Bei Anwendung von Duoventrinetten N zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:**

Aluminiumhaltige säurebindende Magenmittel erhöhen bei gleichzeitiger Einnahme mit säurehaltigen Getränken (Obstsäfte, Wein u.a.) die Aluminiumaufnahme aus dem Darm. Dies gilt auch für Brausetabletten, die Zitronensäure bzw. Weinsäure enthalten.

**Schwangerschaft und Stillzeit:**

Das Nutzen-Risiko-Verhältnis sollte vor der Einnahme von aluminiumhaltigen Antazida während der Schwangerschaft sorgfältig abgewogen werden.

Das Arzneimittel soll in der Schwangerschaft nur kurzfristig angewendet werden, um eine Aluminiumbelastung des Kindes zu vermeiden.

Sie können Duoventrinetten N während der Stillzeit anwenden. Aluminiumverbindungen gehen in die Muttermilch über. Ein Risiko für Neugeborene ist nicht anzunehmen, da nur sehr geringe Mengen aufgenommen werden.

**Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

**Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Duoventrinetten N**

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Duoventrinetten N daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

**3. WIE IST DUOVENTRINETTEN N EINZUNEHMEN?**

Nehmen Sie Duoventrinetten N immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene im Allgemeinen 1 Stunde nach jeder Mahlzeit und vor dem Schlafengehen 2 Tabletten ein.

Die Tabletten werden gelutscht oder gut zerkaut eingenommen.

**Wie lange sollten Sie Duoventrinetten N anwenden?**

Die Dauer der Behandlung richtet sich nach Art und Schwere der Erkrankung. Bei leichteren Magenbeschwerden und Gastritis werden die Tabletten nach Bedarf eingenommen.

**Wenn Sie eine größere Menge Duoventrinetten N eingenommen haben, als Sie sollten:**

Bei Überdosierung kann es zu Änderungen im Stuhlverhalten kommen. Therapeutische Maßnahmen sind hier im Allgemeinen nicht erforderlich.

**4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Bei Patienten mit stark eingeschränkter Nierenfunktion kann die Einnahme von magnesium- und aluminiumhaltigen Medikamenten wie Duoventrinetten N einen erhöhten Magnesiumgehalt des Blutes (Hypermagnesiämie) und einen Anstieg der Serum-Aluminiumspiegel verursachen.

Bei ungenügender Nierenleistung (Niereninsuffizienz) und bei langfristiger Einnahme hoher Dosen kann es zu Aluminiumeinlagerung vor allem in das Nerven- und Knochengewebe und zur Phosphatverarmung kommen. Bei langfristigem Gebrauch sollten die Aluminiumblutspiegel regelmäßig kontrolliert werden und 40 µg/l nicht überschreiten.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn die aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigen oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

#### 5. WIE IST DUOVENTRINETTEN N AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Blister und Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

##### **Aufbewahrungsbedingungen:**

Trocken und nicht über 25°C aufbewahren.

#### 6. WEITERE INFORMATIONEN

##### **Was Duoventrinetten N enthält:**

##### Die Wirkstoffe sind:

1 Tablette enthält: Magnesiumhydroxid 75 mg, Magnesiumtrisilicat x H<sub>2</sub>O 150 mg, Aluminiumhydroxid-Magnesiumcarbonat-Gel getr. 250 mg (entspr. 100-110 mg Aluminiumoxid, 15-22,5 mg Magnesiumoxid) (entsprechend einer Neutralisationskapazität von 10 mEq Salzsäure).

##### Die sonstigen Bestandteile sind:

Aromastoff; Saccharin-Natrium; Copovidon; Macrogol 400; hochdisperses Siliciumdioxid; Stärkehydrolysat; Talkum; Calciumstearat (Ph.Eur.); Poly(O-carboxymethyl)stärke, Natriumsalz; Maisstärke; Lactose-Monohydrat.

##### **Wie Duoventrinetten N aussieht und Inhalt der Packung:**

Duoventrinetten N ist eine runde weiße Tablette.

Erhältlich in einer Originalpackung mit 50 Kautabletten.

##### **Pharmazeutischer Unternehmer:**

PHARMA SCHWÖRER GmbH  
Goethestraße 29, D-69257 Wiesenbach  
Tel.: 06223/4347 Telefax: 06223/47438  
E-Mail: info@pharma-schwoerer.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet und genehmigt im April 2008

palde-gi-duoventrinetten-n-v01

LOGO