

## GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER

# ANGOCIN® *Bronchialtropfen*

Andornkraut-Fluidextrakt

Erwachsene und Jugendliche über 12 Jahre

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach einer Woche nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist ANGOCIN® *Bronchialtropfen* und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von ANGOCIN® *Bronchialtropfen* beachten?
3. Wie ist ANGOCIN® *Bronchialtropfen* einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist ANGOCIN® *Bronchialtropfen* aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

### 1. WAS IST ANGOCIN® *BRONCHIALTROPFEN* UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

#### Stoffgruppe:

ANGOCIN® *Bronchialtropfen* ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel.

Der Wirkstoff ist: Andornkraut-Fluidextrakt

#### Anwendungsgebiete:

ANGOCIN® *Bronchialtropfen* ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Schleimlösung bei Husten im Rahmen von Erkältungen.

Das Arzneimittel ist ein traditionelles Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist.

Der Anwender sollte bei fortdauernden Krankheitssymptomen oder beim Auftreten anderer als in der Packungsbeilage erwähnten Nebenwirkungen einen Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person konsultieren.

### 2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON ANGOCIN® *BRONCHIALTROPFEN* BEACHTEN?

**ANGOCIN® *Bronchialtropfen* darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie allergisch gegen Andornkraut sind.

#### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie ANGOCIN® *Bronchialtropfen* einnehmen. Bei Fieber, Atemnot, eitrigem oder blutigem Auswurf, sowie bei Beschwerden die länger als eine Woche andauern, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

#### **Kinder:**

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern unter 12 Jahren liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es soll deshalb bei dieser Altersgruppe nicht angewendet werden.

#### **Einnahme von ANGOCIN® *Bronchialtropfen* zusammen mit anderen Arzneimitteln:**

Zu möglichen Wechselwirkungen liegen keine Untersuchungen vor.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

#### **Schwangerschaft und Stillzeit:**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Die Sicherheit während der Schwangerschaft und Stillzeit wurde nicht ausreichend untersucht.

Für Schwangere und Stillende wird die Einnahme von ANGOCIN® *Bronchialtropfen* nicht empfohlen.

#### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen:**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

#### **ANGOCIN® *Bronchialtropfen* enthält 23 Vol.-% Alkohol.**

Pro Dosis ANGOCIN® *Bronchialtropfen* (40 Tropfen) werden 0,33 g Alkohol zugeführt.

### 3. WIE IST ANGOCIN® *BRONCHIALTROPFEN* EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die übliche Dosis für Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene ist 3mal täglich 40 Tropfen (Tagesgesamt-dosis 120 Tropfen).

**Art der Anwendung:**

Nehmen Sie die Tropfen bitte mit ausreichend Flüssigkeit vor oder zu den Mahlzeiten ein.

**Dauer der Anwendung:**

Nehmen Sie ANGOCIN® *Bronchialtropfen* im Rahmen der Selbstmedikation nicht länger als eine Woche ein. Bei Beschwerden, die länger als eine Woche dauern, ist ein Arzt aufzusuchen. Bitte beachten Sie hierzu auch die Angaben im Abschnitt „Besondere Vorsicht bei der Einnahme von ANGOCIN® *Bronchialtropfen*“.

**Wenn Sie eine größere Menge von ANGOCIN® *Bronchialtropfen* eingenommen haben, als Sie sollten:**

Vergiftungen infolge einer Überdosierung sind bisher nicht bekannt geworden. Wenn Sie versehentlich einmal mehr als die empfohlene Menge eingenommen haben, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen. Bei Einnahme von deutlich darüber hinausgehenden Mengen benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt. Ihr Arzt wird über die notwendigen Maßnahmen entscheiden.

**Wenn Sie die Einnahme von ANGOCIN® *Bronchialtropfen* vergessen haben:**

Wenn Sie eine Einnahme vergessen haben, nehmen Sie beim nächsten Mal nicht die doppelte Menge ein. Setzen Sie die Einnahme mit der nächsten Dosis fort, so wie von Ihrem Arzt verordnet oder in der Gebrauchsinformation beschrieben.

**4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

**Mögliche Nebenwirkungen:**

Bisher sind keine Nebenwirkungen nach Anwendung von ANGOCIN® *Bronchialtropfen* bekannt.

**Meldung von Nebenwirkungen:**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**5. WIE IST ANGOCIN® *BRONCHIALTROPFEN* AUFZUBEWAHREN?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nach Anbruch ist der Inhalt der Packung innerhalb von 12 Monaten zu verbrauchen.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

**6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN**

**Was ANGOCIN® *Bronchialtropfen* enthält:**

Der Wirkstoff ist:

1 ml (entspr. 1,04 g) Fluidextrakt enthält: 1,04 g Fluidextrakt aus Andornkraut (1: 0,9 –1,1); Auszugsmittel: Ethanol 30 % (V/V).

1 ml Fluidextrakt entspricht ca. 24 Tropfen.

**Wie ANGOCIN® *Bronchialtropfen* aussieht und Inhalt der Packung:**

ANGOCIN® *Bronchialtropfen* ist eine dunkelbraune Flüssigkeit mit aromatischem Geruch und bitterem Geschmack.

Originalpackung mit 50 ml (N2) Fluidextrakt.



**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

Repha GmbH  
Biologische Arzneimittel  
Alt-Godshorn 87  
30855 Langenhagen

Tel.: 05 11 / 7 86 10-0  
Fax: 05 11 / 7 86 10-99  
Internet: [www.repha.de](http://www.repha.de)  
E-Mail: [info@repha.de](mailto:info@repha.de)

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Juli 2015.**