

Liebe Eltern!

Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollten. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsanweisung

NYDA® plus

Zusammensetzung:

Hoch- und niedrigviskoses Dimeticon, mittelkettige Triglyceride, Jojobawachs

Anwendungsgebiete:

NYDA® plus wird angewendet zur physikalischen Behandlung des Kopfhaares bei Befall mit Kopfläusen (Pediculus capitis). Bei bestimmungsgemäßer Anwendung von NYDA® plus werden nicht nur die erwachsenen Läuse, sondern auch die Jugendstadien (Larven) und die Eier (Nissen) der Kopfläuse abgetötet.

Wirkprinzip:

NYDA® plus dringt schnell in alle Verzweigungen des Atemsystems der Läuse und Larven sowie in die Eier ein und verdrängt dort den Sauerstoff. Dies führt zu deren Erstickung.

Gegenanzeigen:

NYDA® plus darf bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber den Bestandteilen nicht angewendet werden.

Beim Auftreten eventueller allergischer Hautreaktionen sollte NYDA® plus sofort abgesetzt werden.

Aufgrund fehlender Erfahrungen sollte NYDA® plus in der Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei Kindern unter 2 Jahren nicht angewendet werden.

Warnhinweise:

NYDA® plus ist nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt!

Bei der Anwendung von NYDA® plus sollten Sie darauf achten, dass die Lösung nicht mit den Augen oder den Schleimhäuten von Mund und Nase in Kontakt kommt. Bei versehentlichem Augenkontakt 10-15 Minuten mit viel Wasser spülen. Bei anhaltender Reizung wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Vermeiden Sie es, NYDA® plus zu inhalieren!

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass NYDA® plus mit einzelnen Haarpflegemitteln und Haartönungsmitteln reagiert! Da einige Inhaltsstoffe entzündlich sind, darf NYDA® plus nicht in Anwesenheit eines offenen Feuers oder glühender Gegenstände (auch z.B. Fön) angewendet werden! Halten Sie NYDA® plus von Hitze- und Zündquellen fern und rauchen Sie nicht während der Behandlung.

Wird NYDA® plus versehentlich verschüttet, besteht Rutschgefahr. Entfernen Sie daher die Lösung an diesen Stellen sofort.

Nebenwirkungen:

In seltenen Fällen kann es zu allergischen Reaktionen kommen, die durch einen Inhaltsstoff des Medizinproduktes ausgelöst werden.

Allgemeine Anwendungshinweise:

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise, um eine erfolgreiche Beseitigung des Kopflausbefalls zu gewährleisten. Vor dem Erstgebrauch wird der beiliegende Kamm-Applikator auf die Flasche geschraubt. Entfernen Sie hierzu den Deckel der Flasche und schrauben Sie den Kamm-Applikator fest. Bitte heben Sie den Deckel zum Wiederverschließen auf.

Vor der Behandlung mit NYDA® plus:

Vor der Behandlung sollte das gesamte Kopfhaar jedes Familienmitgliedes mit einem Läusekamm (z.B. NYDA® Läuse- und Nissenkamm, in der Apotheke erhältlich) auf Lausbefall untersucht werden. Um Neuinfektionen zu vermeiden, sollten alle Personen mit Läusen am selben Tag behandelt werden. Unbehandelte Personen können sonst eine behandelte Person wieder anstecken. Um eventuelle Knötchen zu entfernen, kann das Haar mit einem normalen Kamm durchgekämmt werden. Dieser sollte nach dem Kämmen gründlich gereinigt werden.

Zur Behandlung mit NYDA® plus:

Zur Behandlung mit NYDA® plus empfehlen wir Ihnen ein Handtuch auf den Schulter-Nackebereich unter die Haare zu legen.



Bescheinigung für die Wiederzulassung nach Kopflausbefall

Bitte die Bescheinigung im Kindergarten/in der Schule etc. abgeben!

Erklärung der Eltern/Sorgeberechtigten des Kindes

(Name des Kindes)

Ich habe den Kopf meines Kindes untersucht, Läuse/Nissen gefunden und eine Erstbehandlung mit einem Kopflausmittel durchgeführt. Ich versichere, dass ich in 9 Tagen (+/- 24 Stunden) eine zweite Behandlung durchführen werde.

Datum

Unterschrift eines Elternteils/Sorgeberechtigten



Feuer, offenes Licht
und Rauchen
verboten



Cargen-
bezeichnung



Verwendbar bis:

Die Anwendung von NYDA® plus erfolgt im trockenen Haar

1. NYDA® plus mit Hilfe des Kamm-Applikators auftragen und in das Haar einmassieren.

Nehmen Sie die Flasche und setzen Sie den Kamm-Applikator leicht schräg am Haaransatz im Bereich des Mittelscheitels an. Ziehen Sie den Kamm-Applikator nun behutsam entlang der Kopfhaut nach unten.

Tipp: Bei der Anwendung im Stirn- und Schläfenbereich empfiehlt es sich, den Kopf in den Nacken zu legen, damit die Lösung nicht in die Augen gelangt. Wiederholen Sie diesen Vorgang bis der gesamte Haaransatz mit NYDA® plus behandelt wurde. Danach massieren Sie die Lösung ein, bis das Haar vollständig benetzt ist. So ist sichergestellt, dass alle Läuse, Larven und Nissen mit der Lösung in Kontakt kommen und NYDA® plus optimal wirken kann. Die erforderliche Menge hängt von der Haarfülle und -länge ab. Dabei müssen Sie die Haare in der Nähe der Kopfhaut und hinter den Ohren besonders gut mit NYDA® plus behandeln, denn hier befinden sich die meisten Läuse und Nissen. Langes und besonders dichtes Haar sollten Sie strähnenweise behandeln.



2. Lassen Sie NYDA® plus 1 Stunde einwirken.

Die Läuseeier (Nissen) sind sehr widerstandsfähig. Lassen Sie daher NYDA® plus 1 Stunde einwirken, damit auch die hartnäckigen Läuseeier erstickt werden können. Nach dieser Zeit sind die Läuse, ihre Larven und die Eier getötet, so dass keine Ansteckungsgefahr mehr besteht.



3. Nach 1 Stunde können Sie die erstickten Läuse mit einem Läusekamm auskämmen.

Nach der Einwirkzeit von 1 Stunde können Sie das Haar mit einem Läusekamm (z.B. NYDA® Läuse- und Nissenkamm) sorgfältig auskämmen und es somit von den erstickten Läusen befreien.

NYDA® plus erleichtert Ihnen das Auskämmen, da seine spezielle Zusammensetzung selbst lange Haare sehr gut kämmbar macht.



4. Haare mit handelsüblichem Shampoo auswaschen.

Nach 1 Stunde kann NYDA® plus mit Ihrem üblichen Shampoo ausgewaschen werden. Eventuell noch vorhandene Reste der Lösung nach der ersten Wäsche können mit einer weiteren Haarwäsche problemlos entfernt werden.



5. Anwendung unbedingt wiederholen.

Zur vollständigen Beseitigung des Kopflausbefalls muss die Behandlung gemäß den allgemeinen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts unbedingt wiederholt werden.

Allgemeines Behandlungsschema in Anlehnung an die Empfehlung des Robert Koch-Instituts:

Behandlungstag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Anwendung	x								x	

Führen Sie die Zweitbehandlung wie zuvor unter Punkt 1. - 4. beschrieben an Tag 9 (+/- 24 Stunden) durch.

Was sollten Sie bei Kopflausbefall zusätzlich tun?

Um einer Verbreitung der Kopfläuse und einem neuen Kopflausbefall vorzubeugen, sollten alle Familienmitglieder ebenfalls auf Kopfläuse kontrolliert und gegebenenfalls zeitnah behandelt werden.

Aufbewahrungshinweis:

Nicht über 25 °C lagern. Flasche aufrecht lagern.

Wir empfehlen nach Gebrauch den Kamm-Applikator abzuschrauben und den Deckel wieder fest aufzuschrauben. NYDA® plus soll nach Ablauf des auf der Packung angegebenen Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Apothekenpflichtiges Medizinprodukt

Medizinprodukte sorgfältig und für Kinder unzugänglich aufbewahren.



Da einige Inhaltsstoffe entzündlich sind, darf NYDA® plus nicht in Anwesenheit eines offenen Feuers oder glühender Gegenstände (auch z.B. Fön) angewendet werden! Halten Sie NYDA® plus von Hitze- und Zündquellen fern und rauchen Sie nicht während der Behandlung.

Hersteller: G.Pohl-Boskamp GmbH & Co.KG, Kieler Straße 11, 25551 Hohenlockstedt

Internet: www.pohl-boskamp.de, E-Mail: info@pohl-boskamp.de

Telefon : 04826/59-0, Telefax : 04826/59109

Stand der Information: September 2011

Alles über Kopfläuse und ihre optimale Behandlung unter www.nyda.de

POHL BOSKAMP

CE 0482



Zu Ihrer Information:

Bescheinigung für die Wiedezulassung nach Kopflausbefall

Liebe Eltern,

Sie haben bei Ihrem Kind Kopflausbefall festgestellt. Damit Ihr Kind wieder eine Gemeinschaftseinrichtung (Kindergarten, Schule, ...) besuchen kann, ist die erfolgreiche Anwendung eines Kopflausmittels notwendig. Die erfolgte Erstbehandlung müssen Sie dann der Gemeinschaftseinrichtung schriftlich bestätigen. Hierzu können Sie die umseitige „Bescheinigung für die Wiedezulassung nach Kopflausbefall“ verwenden. Da eine Weiterverbreitung von Kopfläusen bereits nach der ersten Anwendung nicht mehr zu befürchten ist, kann Ihr Kind bereits am nächsten Tag die Gemeinschaftseinrichtung wieder besuchen. Eine weitere Bescheinigung über die Zweitbehandlung nach 9 Tagen (+/- 24 Stunden) ist nicht notwendig.