

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient!  
Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinfoimation aufmerksam durch, da sie wichtige  
Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels  
beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## Jsonettin® S

Homöopathisches Arzneimittel

### Zusammensetzung

1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Allium sativum spag., Krauß Trit. D4 (HAB V27) 0,0057 g, Chennopodium ambrosoides var. anthelminticum ex planta tota sicc. spag., Krauß Trit. D4 (HAB V20) 0,0057 g, Dictamnus albus e radice (HAB V28) 0,0057 g, Imperatoria ostruthium (HAB 34) spag., Krauß Trit. D4 (HAB V27) 0,0057 g, Ruta graveolens spag., Krauß Trit. D4 (HAB V27) 0,0057 g, Thymus serpyllum spag., Krauß Trit. D4 (HAB V28) 0,0057 g, Euphorbium Trit. D4 (HAB V27) 0,0057 g, Aesculus hippocastanum spag., Krauß Trit. D4 (HAB V29) 0,004 g, Berberis (HAB 34) spag., Krauß Trit. D4 (HAB V30) 0,004 g, Cetraria islandica spag., Krauß Trit. D4 (HAB V30) 0,004 g, Cinchona calisaya ex cortex ramis spag., Krauß Trit. D4 (HAB V30) 0,004 g, Cinchona pubescens spag., Krauß Trit. D4 (HAB V30) 0,004 g, Coelcareia officinalis spag., Krauß Trit. D4 (HAB V27) 0,004 g, Erythraea centaurium ex planta tota rec. spag., Krauß Trit. D4 (HAB V27) 0,004 g, Hydrastis canadensis spag., Krauß Trit. D4 (HAB V30) 0,004 g, Nasturtium officinale spag., Krauß Trit. D4 (HAB V27) 0,004 g, Salix alba (HAB 34) spag., Krauß Trit. D4 (HAB V28) 0,004 g, Sambucus nigra spag., Krauß Trit. D4 (HAB V27) 0,004 g, Sarsaparilla spag., Krauß Trit. D4 (HAB V30) 0,004 g, Scrophularia nodosa spag., Krauß Trit. D4 (HAB V27) 0,004 g, Veronica officinalis spag., Krauß Trit. D4 (HAB V28) 0,004 g; Tussilago farfara e floribus rec. spag., Krauß Trit. D6 (HAB V27) 0,004 g. Die Bestandteile werden über die letzte Stufe gemeinsam potenziert.  
Sonstige Bestandteile: Magnesiumstearat (Ph.Eur.), Weizenstärke.  
150 Tabletten zum Einnehmen

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**  
ISO-Arzneimittel GmbH & Co. KG  
Bunzenstr. 6–10  
76275 Ettringen  
[www.iso-arznei.de](http://www.iso-arznei.de)

### Anwendungsgebiet

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortduernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

### Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie *Jsonettin® S* nicht anwenden?

*Jsonettin® S* darf nicht eingenommen werden bei einer Chininüberempfindlichkeit, oder wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Weizenstärke oder einem der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels sind.

### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Wann dürfen Sie *Jsonettin® S* erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden?

Weizenstärke kann geringe Mengen Güten enthalten. Diese gelten aber auch für Patienten, die an Zöliakie leiden, als verträglich.

Dieses Arzneimittel enthält Lactose (Milchzucker). Bitte nehmen Sie *Jsonettin® S* daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegen bestimmte Zuckerarten leiden.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von *Jsonettin® S*? Welche Genusmittel, Speisen und Getränke sollten Sie meiden?

Bisher ist keine Beeinflussung der Wirkung durch andere Arzneimittel bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie bitte Ihren Arzt.

### Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen *Jsonettin® S* nicht anders verordnet wurde:

Wie viel sollten Sie von *Jsonettin® S* einnehmen und wie oft sollten Sie es anwenden?

Bei akuten Beschwerden sollten Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren halbstündlich bis stündlich je 1 Tablette (höchstens 6-mal täglich) einnehmen. Die häufige allgemein gültigen „Anwendungsbereiche“ angegeben werden dürfen, wie Sie es von anderen Arzneimitteln gewohnt sind.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter [www.iso-arznei.de](http://www.iso-arznei.de).

Homöopathische Arzneimittel erhalten Sie ausschließlich in der Apotheke.

Wir wünschen Ihnen eine gute Besserung.

ISO-Arzneimittel - Naturheilkundliche Präparate mit Tradition und Zukunft

Arzneimittel sollten für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden!

### Nebenwirkungen

Einnahme bei akuten Beschwerden sollte ohne Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten nicht länger als 1 Woche erfolgen. In chronischen Fällen sollten Sie 1- bis 3-mal täglich je 1 Tablette einnehmen.  
Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Wie sollten Sie *Jsonettin® S* anwenden?

Die Tabletten sollten nicht mit den Mahlzeiten, sondern mindestens eine halbe Stunde vor oder nach dem Essen eingenommen werden. Sie sollten die Tabletten vorzugsweise langsam im Mund zergehen lassen.

Wie lange sollten Sie *Jsonettin® S* anwenden?

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

### Anwendungsfehler und Überdosierung

Was müssen Sie beachten, wenn das Arzneimittel in zu großen Mengen angewendet wurde (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?  
Bei der Einnahme großer Mengen (z. B. Packungsinhalt) kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine aufführende Wirkung auftreten. Bitte wenden Sie sich in solchen Fällen an Ihren Arzt.

Weinenwirkungen

In seltenen Fällen können nach Einnahme von chininhaltigen Arzneimitteln Überempfindlichkeitsreaktionen wie Hautallergien oder Fieber auftreten. In diesen Fällen ist ein Arzt aufzusuchen.

Hinweis: Eine Sensibilisierung gegen Chinin oder Chinidin ist möglich.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

### Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum ist auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung angegeben. Bitte verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum. Nach Öffnung des Behältnisses ist *Jsonettin® S* bis 12 Monate haltbar.

Sie haben ein homöopathisches Präparat von ISO-Arzneimittel erhalten. Dieses Arzneimittel ist nach den Vorschriften des offiziellen Homöopathischen Arzneibuches (HAB) der Bundesrepublik Deutschland und den internationalen Richtlinien für eine sorgfältige Herstellung (GMP) angefertigt worden.  
Zur Herstellung dieses Arzneimittels wurden Heilpflanzen sorgfältig ausgewählt und nach ganzheitlichen Gesichtspunkten zusammengestellt. Die wertvollen Inhaltsstoffe und heilsamen Kräfte der einzelnen Pflanzen werden durch eine