

Lösung zur Anwendung auf der Haut  
Wirkstoffe: Salicylsäure, Milchsäure

**Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Clabin<sup>®</sup> plus jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihr Krankheitsbild verschlimmert oder nach 4-6 Wochen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Die Gebrauchsinformation beinhaltet:

1. Was ist Clabin<sup>®</sup> plus und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Clabin<sup>®</sup> plus beachten?
3. Wie ist Clabin<sup>®</sup> plus anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Clabin<sup>®</sup> plus aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

**1. Was ist Clabin<sup>®</sup> plus und wofür wird es angewendet?**

Clabin<sup>®</sup> plus ist ein Arzneimittel zur äußerlichen Behandlung von Warzen.

**2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Clabin<sup>®</sup> plus beachten?**

**Clabin<sup>®</sup> plus darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie überempfindlich gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen Salicylsäure oder Milchsäure sowie Salicylaten oder einem der sonstigen Bestandteile von Clabin<sup>®</sup> plus sind,
- bei Säuglingen oder
- bei Patienten mit Niereninsuffizienz,
- bei stillenden Müttern, wenn regelmäßig große Hautflächen behandelt werden sollen.

**Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Clabin<sup>®</sup> plus ist erforderlich:**

Clabin<sup>®</sup> plus sollte nicht im Gesicht oder Genitalbereich angewendet werden. Nicht mit Augen und Schleimhäuten in Berührung bringen. Im Zweifelsfall ist der Arzt aufzusuchen.

Warzen sind übertragbar! Um eine Infektionsausbreitung zu verhindern, sollte das eigene Handtuch nie zur Mitbenutzung an andere weitergegeben werden. Bei Vorhandensein von Fußwarzen nicht barfuß gehen.

**Bei Anwendung von Clabin<sup>®</sup> plus mit anderen Arzneimitteln:**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt. Salicylsäure kann die Aufnahme anderer lokal applizierter Arzneimittel durch die Haut verstärken. Die aufgenommene Salicylsäure verzögert den Abbau von Methotrexat und verstärkt die Wirkung von Sulfonylharnstoffen.

**Schwangerschaft und Stillzeit:**

Clabin<sup>®</sup> plus darf in der Schwangerschaft nur kleinflächig (Fläche kleiner als 5 cm<sup>2</sup>) angewendet werden. Clabin<sup>®</sup> plus darf nicht an der stillenden Brust angewendet werden. Die zufällige Aufnahme von Clabin<sup>®</sup> plus durch den Säugling durch Kontakt mit der behandelten Körperstelle muss vermieden werden. Sollte der Arzt eine regelmäßige Behandlung großer Hautflächen mit Clabin<sup>®</sup> plus für notwendig halten, so ist frühzeitig abzustellen, da Risiken wegen mangelnder Entgiftung bei Neugeborenen nicht auszuschließen sind.

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

**3. Wie ist Clabin<sup>®</sup> plus anzuwenden?**

Wenden Sie Clabin<sup>®</sup> plus immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Clabin<sup>®</sup> plus ist zur Anwendung auf der Haut bestimmt.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:  
Clabin<sup>®</sup> plus 2- bis 4-mal täglich auf die Warze(n) auftragen.

Clabin® plus Lösung sollte nicht auf die gesunde Haut in der Umgebung der Warze gelangen. Sie können diese mit einer fetthaltigen Creme schützen. Die behandelten Hautstellen trocknen lassen. Vor dem erneuten Auftragen sollte der vorhandene Film durch Abziehen oder Abrubbeln entfernt werden. Bei regelmäßiger Anwendung lässt sich die erweichte Hornschicht nach einigen Tagen mühelos entfernen, ggf. nach einem heißen Seifenbad. Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis die Warze abgetragen ist oder abfällt.

Die Anwendung von Clabin® plus über einen Zeitraum von 4 bis 6 Wochen ist im Normalfall ausreichend. Wenden Sie Clabin® plus ohne ärztlichen Rat nicht länger an.

Die maximale tägliche Dosis für Erwachsene von 2 g darf nicht länger als 1 Woche angewendet werden. Für Kinder darf die Tagesdosis von 0,2 g nicht überschritten werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Clabin® plus zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

#### 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Clabin® plus Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zu Grunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 Behandler von 10
Häufig:	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich:	1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten:	1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten:	weniger als 1 Behandler von 10.000
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Clabin® plus ruft gelegentlich leichtes und bei häufigerem Auftragen auch ein stärkeres Brennen besonders auf der die Warze umgebenden Haut hervor.

Ferner sind in sehr seltenen Fällen beschrieben worden: Überempfindlichkeitsreaktionen auf der Haut (allergische Kontaktdermatitis), Erweiterung kleiner, oberflächlicher Hautgefäße (Teleangiectasien), braune Flecke, Lichtempfindlichkeit mit Auftreten von Hauterscheinungen nach Sonnenbestrahlung (Photosensibilisierung), Hautentzündung (Dermatitis), Verdünnung der oberen Hautschichten, Pigmentierung, Depigmentierung.

Im Falle übermäßiger Reizung sollte die Behandlung zwischenzeitlich unterbrochen und nach Abklingen der Reaktion wieder aufgenommen werden. Im Falle ernsterer Nebenwirkungen als Reizungen suchen Sie bitte einen Arzt auf.

#### Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (siehe unten) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden. Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn, Website: <http://www.bfarm.de>

#### 5. Wie ist Clabin® plus aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Flasche und der Faltschachtel angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Nicht über 25 °C aufbewahren. Vorsicht, leicht entflammbar! Von offenem Feuer fernhalten.

Verschließen Sie nach Anwendung Clabin® plus gut und stellen Sie sicher, dass sich keine Lösung mehr am Flaschenhals befindet. So verhindern Sie ein Auskristallisieren von Clabin® plus und ein Verkleben der Öffnung.

#### Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch:

Clabin® plus ist nach Anbruch 4 Monate haltbar.

#### 6. Weitere Informationen

10 g Clabin® plus Lösung zur Anwendung auf der Haut enthalten:  
Wirkstoffe: Milchsäure (Ph. Eur.) 1,67 g, Salicylsäure (Ph. Eur.) 1,67 g

Die sonstigen Bestandteile sind:

Elastisches Collodium (bestehend aus: Ethanol, Ether, Pyroxilin, Kolophonium, Rizinusöl).

Clabin® plus ist in Packungen mit 15 ml Lösung erhältlich.

**Pharmazeutischer Unternehmer:**  
Perrigo Deutschland GmbH,  
Königstraße 26, DE-70173 Stuttgart

**Hersteller:**  
Delpharm Bladel B.V.  
Industrieweg 1, 5531 AD Bladel, Niederlande

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Juni 2023.