

# OCUsalin® 5 % UD

## Augentropfen mit Natriumchlorid 5%

### BESCHREIBUNG

OCUsalin® 5 % UD ist eine sterile, hypertone, konservierungsmittelfreie ophthalmische Kochsalzlösung, abgefüllt in Ein-Dosis-Behältnissen.


OCUsalin® 5 % UD wird angewendet zur Behandlung von Hornhautödemen und entzieht durch seine physikalisch-osmotischen Eigenschaften die überschüssige Flüssigkeit und verbessert somit das Sehvermögen.

OCUsalin® 5 % UD findet vor allem Anwendung nach Augenoperationen (z. B. Kataraktoperationen) und diagnostischen Eingriffen am Auge (z. B. Gonioskopie) durch die das osmotische Gleichgewicht des Hornhautgewebes gestört wurde.

### ANWENDUNG

Trennen Sie ein Ein-Dosis-Behältnis ab. Vergewissern Sie sich, dass jedes Ein-Dosis-Behältnis unbeschädigt ist. Zum Öffnen drehen Sie das flache Ende des Ein-Dosis-Behältnisses ab (nicht ziehen). Legen Sie den Kopf etwas zurück, ziehen Sie das Unterlid leicht vom Auge ab und geben Sie 3-5mal täglich einen Tropfen in den Bindehautsack des Auges. Schließen Sie langsam die Augen, damit sich die Flüssigkeit gleichmäßig auf der Oberfläche des Auges verteilen kann.

Die Anwendungsdauer sowie die Dosierung sollten Sie mit Ihrem Augenarzt absprechen.



### ZUSAMMENSETZUNG

1 ml enthält: Natriumchlorid 5%, Wasser für Injektionszwecke.

### PACKUNGSGRÖSSEN

Verkaufseinheiten:

- Ein-Dosis-Behältnisse, 20 x 0,5 ml.
- Ein-Dosis-Behältnisse, 50 x 0,5 ml.

### VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNHINWEISE

- Bitte verwenden Sie das Medizinprodukt nicht ohne ärztliche Empfehlung!

- Nicht verwenden bei beschädigtem Ein-Dosis-Behältnis.
- Das Auge mit dem Ein-Dosis-Behältnis nicht berühren.
- Wegen des Kontaminationsrisikos den Kontakt mit der Öffnung des Ein-Dosis-Behältnisses vermeiden.
- Bei dieser Art von Hornhauterkrankungen sollte generell auf das Tragen von Kontaktlinsen verzichtet werden. Sollte das Tragen von Kontaktlinsen zwingend erforderlich sein, so müssen sie vor der Anwendung entfernt werden.
- Warten Sie nach der Anwendung mindestens 15 Minuten, bevor Sie die Kontaktlinsen wieder einsetzen.
- Sollen andere Arzneimittel gleichzeitig mit **OCUsalin® 5% UD** am Auge angewendet werden, sprechen Sie bitte mit Ihrem behandelnden Augenarzt. Es sollte ein Abstand von mindestens 5 Minuten zwischen den beiden Anwendungen eingehalten werden.
- Es kann ein Brennen und/oder eine Irritation des betroffenen Auges auftreten.
- Nur zur einmaligen Anwendung bestimmt; da **OCUsalin® 5% UD** keine Konservierungsmittel enthält, sollten Reste der Lösung nicht mehr verwendet werden.
- Verwenden Sie die Augentropfen nicht nach Ablauf des Verfalldatums. Dieses finden Sie auf jedem Ein-Dosis-Behältnis und der Faltschachtel eingeprägt.

#### LAGERUNG

Bei 2° C bis 25° C lagern. Vor Frost schützen. Ein-Dosis-Behältnisse vor Licht geschützt im Originalkarton aufbewahren.

 Chargen-Nummer und  „verwendbar bis“ sind auf dem Ein-Dosis-Behältnis eingeprägt.

 aseptische Herstellung.



nur zum Einmalgebrauch.



Beschreibung und Art der Anwendung siehe beigefügte Gebrauchsanweisung.



Lagerungstemperatur.



Nicht verwenden bei beschädigtem Ein-Dosis-Behältnis.



**Hersteller:**

Penta Arzneimittel GmbH  
Werksstraße 3  
92551 Stulln  
Deutschland

**Vertrieb in Deutschland:**

Pharma Stulln GmbH  
Werksstraße 3  
92551 Stulln  
Deutschland

 0483