

Salus

GEBRAUCHSINFORMATION:
INFORMATION FÜR
DEN ANWENDER

Gallexier® KRÄUTERBITTER ELIXIER

Flüssigkeit zum Einnehmen
Zur Anwendung bei Erwachsenen

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in der Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes, Apothekers oder des medizinischen Fachpersonals ein.
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 2 Wochen nicht besser fühlen oder wenn Sie sich gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was ist Gallexier Kräuterbitter Elixier und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Gallexier Kräuterbitter Elixier beachten?
3. Wie ist Gallexier Kräuterbitter Elixier einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Gallexier Kräuterbitter Elixier aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Gallexier Kräuterbitter Elixier und wofür wird es angewendet?

Gallexier Kräuterbitter Elixier ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel angewendet zur Unterstützung der Magen-Darm-Funktion und des Leber-Galle-Systems.

Das Arzneimittel ist ein traditionelles Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Gallexier Kräuterbitter Elixier beachten?

Gallexier Kräuterbitter Elixier darf nicht eingenommen werden:

- wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie gegen einen der Wirkstoffe, gegen weitere Korbblütler wie z. B. Beifuß, gegen Doldenblütler wie Anis, Kümmel, Sellerie, Koriander und Dill, gegen Anethol (in Fenchel enthalten) oder den sonstigen Bestandteil Fructose überempfindlich (allergisch) reagiert haben
- bei Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren, bei Gallensteinen, Verschluss oder Entzündungen der Gallenwege, anderen Gallenwegserkrankungen und Lebererkrankungen
- wenn Sie an einem hormonabhängigen Tumor leiden oder in der Vergangenheit gelitten haben
- wenn Sie stillen oder schwanger sind
- von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Während der Anwendung sollte eine intensive UV-Bestrahlung (z. B. lange Sonnenbäder, Solarien) vermieden werden, da Gallexier Kräuterbitter Elixier Bitterorangenschalen enthält, deren Inhaltsstoffe die Haut lichtempfindlicher machen.

Kinder und Jugendliche

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen Gallexier Kräuterbitter Elixier nicht einnehmen.

Einnahme von Gallexier Kräuterbitter Elixier zusammen mit anderen Arzneimitteln

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher nicht bekannt. Untersuchungen mit Gallexier Kräuterbitter Elixier zu Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln wurden nicht durchgeführt.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Während der Schwangerschaft und Stillzeit darf Gallexier Kräuterbitter Elixier nicht eingenommen werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine Beeinträchtigungen bekannt. Untersuchungen hierzu mit Gallexier Kräuterbitter Elixier liegen nicht vor.

Gallexier Kräuterbitter Elixier enthält Fructose

Dieses Arzneimittel enthält 3,9 g Fructose pro 20 ml.

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt bevor Sie dieses Arzneimittel einnehmen oder erhalten, wenn Ihr Arzt Ihnen mitgeteilt hat, dass Sie eine Unverträglichkeit gegenüber einigen Zuckern haben oder wenn bei Ihnen eine hereditäre Fructoseintoleranz (HFI) – eine seltene angeborene Erkrankung, bei der Fructose nicht abgebaut werden kann – festgestellt wurde.

Hinweis für Diabetiker:

20 ml entsprechen 0,3 BE

3. Wie ist Gallexier Kräuterbitter Elixier einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in der Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes, Apothekers oder des medizinischen Fachpersonals ein.

bitte wenden ↗

Fragen Sie bei Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Vor Gebrauch schütteln.

Dosierung

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene

Für die 250 ml- und 500 ml-Packung:

Erwachsene nehmen 3-mal täglich 20-40 ml mit beiliegendem Messbecher ein.

Für die 3 x 20 ml-Packung

(1 Fläschchen entspricht 20 ml):

Erwachsene nehmen 3-mal täglich den Inhalt von 1–2 Fläschchen ein.

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen Gallexier Kräuterbitter Elixier nicht einnehmen.

Art der Anwendung

Gallexier Kräuterbitter Elixier wird vor oder zu den Mahlzeiten eingenommen.

Dauer der Anwendung

Gallexier Kräuterbitter Elixier sollte nicht länger als 2 Wochen eingenommen werden.

Der Anwender sollte bei fortdauernden Krankheitssymptomen oder beim Auftreten anderer als der in der Packungsbeilage erwähnten Nebenwirkungen einen Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige, qualifizierte Person konsultieren.

Wenn Sie eine größere Menge von Gallexier Kräuterbitter Elixier eingenommen haben als Sie sollten

Wenn Sie versehentlich einmal 2 – 3 Einzeldosen des Arzneimittels mehr als vorgesehen eingenommen haben, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen. Falls Sie deutlich höhere Dosen eingenommen haben, benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden.

Möglicherweise treten die unten aufgeführten Nebenwirkungen verstärkt auf.

Wenn Sie die Einnahme von Gallexier Kräuterbitter Elixier vergessen haben

Nehmen Sie beim nächsten Mal nicht etwa die doppelte Menge ein, sondern führen Sie die Anwendung, wie in der Dosierungsanleitung beschrieben, fort.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Es kann zu Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut oder der Atemwege, einschließlich schwerer allergischer Reaktionen (Atemnot, Quincke-Ödem, Kreislaufkollaps, anaphylaktischer Schock) kommen. Es können gastrointestinale Beschwerden, wie z. B. trockener Mund, Blähungen, Übelkeit, Sodbrennen, leichter Durchfall auftreten. Bei längerer Einnahme kann es zu Magenschmerzen kommen. Bei längerer Sonnen- oder UV-Bestrahlung ist das Auftreten von sonnenbrandähnlichen Hautreaktionen nicht auszuschließen.

Die Häufigkeit dieser Nebenwirkungen ist auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, beenden Sie bitte die Einnahme von Gallexier Kräuterbitter Elixier.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Gallexier Kräuterbitter Elixier aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel (Umkarton) und dem Behältnis (Etikett) angegebenen Verfalldatum (Datum nach „verwendbar bis“) nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Halbbarkeit nach Anbruch der 250 oder 500 ml-Flaschen: 6 Monate

Nicht über 25 °C lagern.

Die Flasche muss nach Gebrauch sofort verschlossen und im Kühlschrank (2 °C – 8 °C) aufbewahrt werden.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Gallexier Kräuterbitter Elixier enthält

10 ml Flüssigkeit (10,85 g) enthalten als Wirkstoff:

8,9 g Auszug (1 : 10,6–13,0) aus 693 mg einer Mischung aus: Artischockenblätter, Enzianwurzel, Curcumawurzelstock, Löwenzahnkraut mit Wurzel, Ingwerwurzelstock, Schafgarbenkraut, Bittere Fenchel Früchte, Kamillenblüten, Bitterorangeschalen, Benediktenkraut, Bitterkleeblätter, Kardamomenfrüchte, Wermutkraut (41,5 : 11,8 : 8,5 : 7,2 : 5,9 : 5,8 : 4,3 : 4,3 : 2,1 : 1,0 : 1,0 : 0,57)

Auszugsmittel: Wasser

Der sonstige Bestandteil ist:
Fructose

Wie Gallexier Kräuterbitter Elixier aussieht und Inhalt der Packung

Packung mit 3 x 20 ml, 250 ml und 500 ml Flüssigkeit

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Gallexier Kräuterbitter Elixier ist eine klare bis leicht trübe, hellbraune bis braune Flüssigkeit.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Salus Haus GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 24
83052 Bruckmühl
info@salus.de

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Juli 2021.