Phytohustil®

SCHLEIMLÖSER SAFT

1,16 g / 7,5 ml Thymiankraut-Fluidextrakt
0,17 g / 7,5 ml Primelwurzel-Dickextrakt
Flüssigkeit zum Einnehmen

PFLANZLICHES ARZNEIMITTEL

Zur Anwendung bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 1 Jahr

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.
Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.
- Wenn Sie sich schlechter fühlen oder nach einer Woche nicht besser fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Phytohustil® Schleimlöser Saft und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Phytohustil® Schleimlöser Saft beachten?
3. Wie ist Phytohustil® Schleimlöser Saft einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Phytohustil® Schleimlöser Saft aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Phytohustil® Schleimlöser Saft und wofür wird es angewendet?

Phytohustil® Schleimlöser Saft ist ein pflanzliches Arzneimittel bei Erkältungskrankheiten der Atemwege.
Phytohustil® Schleimlöser Saft wird angewendet zur Besserung der Beschwerden bei Erkältungskrankheiten der Atemwege mit zähflüssigem Schleim.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Phytohustil® Schleimlöser Saft beachten?

Phytohustil® Schleimlöser Saft darf nicht eingenommen werden, wenn Sie allergisch gegen Primel, Thymian oder andere Lamiaceen (Lippenblütler), Birke, Beifuß, Sellerie oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bevor Sie Phytohustil® Schleimlöser Saft einnehmen.
Bei Beschwerden, die länger als eine Woche anhalten, oder beim Auftreten von Atemnot, Fieber wie auch bei eitrigem oder blutigem Auswurf sollte umgehend ein Arzt aufgesucht werden.
Vorsicht ist geboten bei Gastritis oder Magengeschwüren.

Kinder und Jugendliche
Es liegen keine Erfahrungen bei der Anwendung von Kindern unter 1 Jahr vor, so dass dieses Arzneimittel bei Kindern unter 1 Jahr nicht angewendet werden sollte.

Einnahme von Phytohustil® Schleimlöser Saft zusammen mit anderen Arzneimitteln
Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

Schwangerschaft und Stillzeit
Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten schwanger zu sein oder beabsichtigen schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.
Die Sicherheit der Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit wurde nicht überprüft. Aufgrund der fehlenden Datenlage kann eine Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen
Aus der bisherigen Anwendung wurden keine entsprechenden Auswirkungen bekannt. Es wurden keine Studien durchgeführt.

Phytohustil® Schleimlöser Saft enthält Maltitol, Saccharose und Ethanol (Alkohol)
Bitte nehmen Sie Phytohustil® Schleimlöser Saft erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Dieses Arzneimittel enthält 390 mg Alkohol (Ethanol) pro 7,5 ml (5-8 % v/v). Die Menge in 7,5 ml dieses Arzneimittels entspricht weniger als 1 ml Bier oder 1 ml Wein. Die geringe Alkoholmenge in diesem Arzneimittel hat keine wahrnehmbaren Auswirkungen.

Einnahme von Phytohustil® Schleimlöser Saft zusammen mit anderen Arzneimitteln

Keine Wechselwirkungen bekannt.

3. Wie ist Phytohustil® Schleimlöser Saft einzunehmen?

Nehmen Sie Phytohustil® Schleimlöser Saft immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Soweit nicht anders verordnet, wird Phytohustil® Schleimlöser Saft folgendermaßen unverdünnt eingenommen:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren
4-mal täglich ..... 7,5 ml
Kinder von 6 bis einschließlich 11 Jahren
3- bis 4-mal täglich ..... 5 ml
Kinder von 3 bis einschließlich 5 Jahren
3-mal täglich ..... 5 ml
Kinder von 1 bis einschließlich 2 Jahren
3-mal täglich ..... 3 ml

Die Dauer der Anwendung richtet sich nach dem Verlauf der Erkrankung und ist vom Arzt zu bestimmen. Bitte beachten Sie die Angaben unter „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung" sowie die Angaben unter „Nebenwirkungen". Vor Gebrauch schütteln!

Wenn Sie eine größere Menge von Phytohustil® Schleimlöser Saft angewendet haben, als Sie sollten

Wenn Phytohustil® Schleimlöser Saft in zu großen Mengen eingenommen wurde, sollte beim nächsten Mal mit der Anwendung, wie vom Arzt verordnet oder in der Dosierungsanleitung beschrieben, fortgefahren werden.

Fälle von Überdosierung sind bisher nicht bekannt.

Wenn Sie die Anwendung von Phytohustil® Schleimlöser Saft vergessen haben

Wenn die Anwendung von Phytohustil® Schleimlöser Saft vergessen wurde, sollte beim nächsten Mal mit der Anwendung, wie vom Arzt verordnet oder in der Dosierungsanleitung beschrieben, fortgefahren werden.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Überempfindlichkeitsreaktionen, wie z.B. Luftnot, Hautausschläge, Nesselsucht sowie Schwellungen in Gesicht, Mund und/oder Rachenraum können auftreten. Es kann auch zu Magenbeschwerden wie Krämpfen, Übelkeit, Erbrechen kommen. Die Häufigkeit ist nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar).

Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion darf Phytohustil® Schleimlöser Saft nicht nochmals eingenommen werden.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de, anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Phytohustil® Schleimlöser Saft aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Nicht im Kühlschrank lagern.

Nach Anbruch ist Phytohustil® Schleimlöser Saft 3 Monate haltbar.

Sollte Phytohustil® Schleimlöser Saft Ausflockungen oder Trübungen aufweisen, so sind diese ohne Einfluss auf die Wirksamkeit des Präparates.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach Ablauf des auf dem Behältnis und dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Phytohustil® Schleimlöser Saft enthält

- Die Wirkstoffe sind (bezogen auf 100 g Flüssigkeit entsprechend 77,5 ml): Fluidextrakt aus Thymiankraut (1 : 2-2,5) 12,0 g
  Auszugsmittel: Ammoniaklösung 10 % (m/m), Glycerol 85 %, Ethanol 90 % (V/V), Wasser (1 : 20 : 70 : 109)
  Dickextrakt aus Primelwurzel (1-2 : 1) 1,8 g
  Auszugsmittel: Ethanol 55 % (V/V)
- Die sonstigen Bestandteile sind: Maltitol-Lösung, schwarzer Johannisbeersirup, Ethanol 96 %, Glycerol 85 %, Wasser.

Wie Phytohustil® Schleimlöser Saft aussieht und Inhalt der Packung

Braun-gelbe Flüssigkeit
Originalpackung mit 150 ml Flüssigkeit zum Einnehmen N1

Pharmazeutischer Unternehmer
Bayer Vital GmbH · Kaiser-Wilhelm-Allee 70
51373 Leverkusen · Deutschland
Telefon: (0214) 30 51 348
E-Mail-Adresse: medical-information@bayer.com

Hersteller
Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH
Havelstraße 5 · 64295 Darmstadt · Deutschland

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Januar 2023.

Johannisbeer-Geschmack

Diesem Arzneimittel ist ein Messbecher beigelegt.

Bayer
91147003